

核准日期：2007年08月27日
修改日期：2025年05月20日

DIKANG

呼吸®

喘舒片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：本品含升华硫及化学药组分盐酸克仑特罗，
不建议长期使用，不得超说明书剂量使用。
运动员慎用。严禁用于食品和饲料加工。

【药品名称】

通用名称：喘舒片

汉语拼音：Chuanshu Pian

【成份】升华硫、大黄花、盐酸双氯醇胺、黄芩提取物。

【性状】本品为糖衣片，除去糖衣后显淡黄色。

【功能主治】温肾纳气，化痰定喘。用于慢性支气管炎，支气管哮喘，
肺气肿，尤适于喘息型气管炎。

【规格】每片含盐酸双氯醇胺10 μg

【用法用量】口服，一次2片，一日3次，小儿酌减，饭后服或遵医嘱。

【不良反应】

1. 心血管系统：心悸或者心动过速、心律失常等，有血压升高的个案报告。
2. 精神和神经系统：震颤、头晕、抽搐或者痉挛等，有失眠的个案报告。
3. 消化系统：口干、恶心、胃灼热、呕吐、腹泻、腹痛等。
4. 其他：皮疹、乏力、多汗、胸闷等。

【禁忌】

1. 对本品及所含成份过敏者禁用。
2. 儿童禁用。
3. 下尿路梗阻患者禁用。
4. 肥厚型梗阻性心脏病、快速性心律失常患者禁用。
5. 本品含升华硫（硫磺），阴虚火旺者禁用。

【注意事项】

1. 本品是中西药复方制剂，含化学药组分盐酸克仑特罗（盐酸双氯氨醇、盐酸双氯醇胺），应当尽量避免合并使用与本品相同或者类似组分的其他药品。使用时应当参照盐酸克仑特罗药品说明书的禁忌及注意事项等安全性信息。
2. 高血压、心脏疾病（心功能不全、心律不齐等）患者慎用。
3. 甲状腺功能亢进、糖尿病、肾功能不全患者慎用。
4. 运动员慎用。
5. 本品为处方药，请在医师指导下使用，不建议长期使用，不得超说明书剂量使用。
6. 本品含有化学药组分盐酸克仑特罗，故应当注意：
(1) 用药期间应当注意监测血清钾：曾有服用β2受体激动剂导致血清钾含

量降低的报道，与黄嘌呤类药物、甾体类药物及利尿剂合并使用时应当注意低钾血症；低氧血症时，血清钾的降低对心脏节律的影响更大，使用时应当特别注意。

(2) 注意药物相互作用：①β受体激动剂、抗胆碱能药、黄嘌呤衍生物(茶碱)和皮质类固醇可能会增强盐酸克仑特罗的作用和不良反应。②β受体阻滞剂对盐酸克仑特罗有拮抗作用。③正接受单胺氧化酶抑制剂或三环类抗抑郁药治疗的患者，应当谨慎使用β2受体激动剂，因为β2受体激动剂活性可能被加强。④吸入卤代麻醉药如氟烷、三氯乙烯和安氟醚可增加β2受体激动剂致心律失常作用。

(3) 避免药物过量：盐酸克仑特罗长期使用或者过量使用时，可致心律不齐或者心力衰竭等严重不良反应，应当特别注意。

(4) 据报道，动物实验(大鼠)中，孕后期使用盐酸克仑特罗后，子宫平滑肌收缩受到抑制，从而引起分娩延迟。盐酸克仑特罗对胎儿的安全性尚不明确，孕妇应当避免使用。盐酸克仑特罗可经乳汁排泄，哺乳期妇女应当停止哺乳或者停药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

本品含盐酸克仑特罗，孕妇应当避免使用本品。哺乳期妇女应当停止哺乳或者停药。

【儿童用药】

儿童禁用。

【老年用药】

老年患者慎用。

【贮藏】密封。

【包装】铝塑泡罩包装，每板12片，每盒1板，每盒2板，每盒3板，每盒4板。

【有效期】36个月

【执行标准】《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册WS₃-B-0636-91

【批准文号】国药准字Z51022508

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

邮政编码：611731

电话号码：4006607322

传真号码：028-87845888

注册地址：成都高新区(西区)迪康大道一号

E-mail：dkyy@dikangyaoye.com

核准日期：2007年08月27日
修改日期：2025年05月20日



喘舒片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：本品含升华硫及化学药组分盐酸克仑特罗，
不建议长期使用，不得超说明书剂量使用。
运动员慎用。严禁用于食品和饲料加工。

【药品名称】

通用名称：喘舒片

汉语拼音：Chuanshu Pian

【成份】

升华硫、大黄粉、盐酸双氯醇胺、黄芩提取物。

【性状】

本品为糖衣片，除去糖衣后显淡黄色。

【功能主治】

温肾纳气，化痰定喘。用于慢性支气管炎，支气管哮喘，
肺气肿，尤适于喘息型气管炎。

【规格】

每片含盐酸双氯醇胺10 μg

【用法用量】

口服，一次2片，一日3次，小儿酌减，饭后服或遵医嘱。

【不良反应】

- 心血管系统：心悸或者心动过速、心律失常等，有血压升高的个案报告。
- 精神及神经系统：震颤、头晕、抽搐或者痉挛等，有失眠的个案报告。
- 消化系统：口干、恶心、胃灼热、呕吐、腹泻、腹痛等。
- 其他：皮疹、乏力、多汗、胸闷等。

【禁忌】

- 对本品及所含成份过敏者禁用。
- 儿童禁用。
- 下尿路梗阻患者禁用。
- 肥厚型梗阻性心脏病、快速性心律失常患者禁用。
- 本品含升华硫（硫磺），阴虚火旺者禁用。

【注意事项】

- 本品是中西药复方制剂，含化学药组分盐酸克仑特罗（盐酸双氯醇胺、盐酸双氯醇胺），应当尽量避免合并使用与本品相同或者类似组分的其他药品。使用时应当参照盐酸克仑特罗药品说明书的禁忌及注意事项等安全性信息。
- 高血压、心脏疾病（心功能不全、心律不齐等）患者慎用。
- 甲状腺功能亢进、糖尿病、肾功能不全患者慎用。
- 运动员慎用。
- 本品为处方药，请在医师指导下使用，不建议长期使用，不得超说明书剂量使用。
- 本品含有化学药组分盐酸克仑特罗，故应当注意：
(1) 用药期间应当注意监测血清钾：曾有服用β₂受体激动剂导致血清钾含

量降低的报道，与黄嘌呤类药物、甾体类药物及利尿剂合并使用时应当注意低钾血症；低氧血症时，血清钾的降低对心脏节律的影响更大，使用时应当特别注意。

(2) 注意药物相互作用：①β受体激动剂、抗胆碱能药、黄嘌呤衍生物（茶碱）和皮质类固醇可能会增强盐酸克仑特罗的作用和不良反应。②β受体阻滞剂对盐酸克仑特罗有拮抗作用。③正接受单胺氧化酶抑制剂或三环类抗抑郁药治疗的患者，应当谨慎使用β₂受体激动剂，因为β₂受体激动剂活性可能被加强。④吸入卤代麻醉药如氟烷、三氯乙烯和安氟醚可增加β₂受体激动剂致心律失常作用。

(3) 避免药物过量：盐酸克仑特罗长期使用或者过量使用时，可致心律不齐或者心力衰竭等严重不良反应，应当特别注意。

(4) 据报道，动物实验（大鼠）中，孕后期使用盐酸克仑特罗后，子宫平滑肌收缩受到抑制，从而引起分娩延迟。盐酸克仑特罗对胎儿的安全性尚不明确，孕妇应当避免使用。盐酸克仑特罗可经乳汁排泄，哺乳期妇女应当停止哺乳或者停药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

本品含盐酸克仑特罗，孕妇应当避免使用本品。哺乳期妇女应当停止哺乳或者停药。

【儿童用药】

儿童禁用。

【老年用药】

老年患者慎用。

【贮藏】

密封。

【包装】

铝塑泡罩包装，每板12片，每盒3板。

【有效期】

36个月

【执行标准】

《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册WS₃-B-0636-91

【批准文号】

国药准字Z51022508

【上市许可持有人】

成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

邮政编码：611731

电话号码：4006607322

销售电话：400-181-8000

传真号码：028-87845888

注册地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

E-mail: dky@dikangyaoye.com

核准日期：2007年08月27日
修改日期：2025年05月20日



喘舒片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：本品含升华硫及化学药组分盐酸克仑特罗，
不建议长期使用，不得超说明书剂量使用。
运动员慎用。严禁用于食品和饲料加工。

【药品名称】

通用名称：喘舒片

汉语拼音：Chuan Shu Pian

【成份】升华硫、大黄粉、盐酸双氯醇胺、黄芩提取物。

【性状】本品为糖衣片，除去糖衣后显淡黄色。

【功能主治】温肾纳气，化痰定喘。用于慢性支气管炎，支气管哮喘，
肺气肿，尤适于喘息型气管炎。

【规格】每片含盐酸双氯醇胺10 μg

【用法用量】口服，一次2片，一日3次，小儿酌减，饭后服或遵医嘱。

【不良反应】

1. 心血管系统：心悸或者心动过速、心律失常等，有血压升高的个案报告。
2. 精神及神经系统：震颤、头晕、抽搐或者痉挛等，有失眠的个案报告。
3. 消化系统：口干、恶心、胃灼热、呕吐、腹泻、腹痛等。
4. 其他：皮疹、乏力、多汗、胸闷等。

【禁忌】

1. 对本品及所含成份过敏者禁用。
2. 儿童禁用。
3. 下尿路梗阻患者禁用。
4. 肥厚型梗阻性心肌病、快速性心律失常患者禁用。
5. 本品含升华硫（硫磺），阴虚火旺者禁用。

【注意事项】

1. 本品是中西药复方制剂，含化学药组分盐酸克仑特罗（盐酸双氯醇胺、盐酸双氯醇胺），应当尽量避免合并使用与本品相同或者类似组分的其他药品。使用时应当参照盐酸克仑特罗药品说明书的禁忌及注意事项等安全性信息。
2. 高血压、心脏疾病（心功能不全、心律不齐等）患者慎用。
3. 甲状腺功能亢进、糖尿病、肾功能不全患者慎用。
4. 运动员慎用。
5. 本品为处方药，请在医师指导下使用，不建议长期使用，不得超说明书剂量使用。
6. 本品含有化学药组分盐酸克仑特罗，故应当注意：
(1) 用药期间应当注意监测血清钾：曾有服用β2受体激动剂导致血清钾含

量降低的报道，与黄嘌呤类药物、甾体类药物及利尿剂合并使用时应当注意低钾血症；低氧血症时，血清钾的降低对心脏节律的影响更大，使用时应当特别注意。

(2) 注意药物相互作用：①β受体激动剂、抗胆碱能药、黄嘌呤衍生物（茶碱）和皮质类固醇可能会增强盐酸克仑特罗的作用和不良反应。②β受体阻滞剂对盐酸克仑特罗有拮抗作用。③正接受单胺氧化酶抑制剂或三环类抗抑郁药治疗的患者，应当谨慎使用β2受体激动剂，因为β2受体激动剂活性可能被加强。④吸入卤代麻醉药如氟烷、三氯乙烯和安氟醚可增加β2受体激动剂致心律失常作用。

(3) 避免药物过量：盐酸克仑特罗长期使用或者过量使用时，可致心律不齐或者心力衰竭等严重不良反应，应当特别注意。

(4) 据报道，动物实验（大鼠）中，孕后期使用盐酸克仑特罗后，子宫平滑肌收缩受到抑制，从而引起分娩延迟。盐酸克仑特罗对胎儿的安全性尚不明确，孕妇应当避免使用。盐酸克仑特罗可经乳汁排泄，哺乳期妇女应当停止哺乳或者停药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

本品含盐酸克仑特罗，孕妇应当避免使用本品。哺乳期妇女应当停止哺乳或者停药。

【儿童用药】

儿童禁用。

【老年用药】

老年患者慎用。

【贮藏】密封。

【包装】铝塑泡罩包装，每板10片，每盒3板。

【有效期】36个月

【执行标准】《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册WS₃-B-0636-91

【批准文号】国药准字Z51022508

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

邮政编码：611731

电话号码：4006607322

传真号码：028-87845888

注册地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

E-mail：dkyy@dikangyaoye.com

核准日期：2007年08月27日
修改日期：2025年05月20日

DIKANG

迪康®

喘舒片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：本品含升华硫及化学药组分盐酸克仑特罗，
不建议长期使用，不得超说明书剂量使用。
运动员慎用。严禁用于食品和饲料加工。

【药品名称】

通用名称：喘舒片

汉语拼音：Chuanshu Pian

【成份】升华硫、大黄粉、盐酸双氯醇胺、黄芩提取物。

【性状】本品为糖衣片，除去糖衣后显淡黄色。

【功能主治】温肾纳气，化痰定喘。用于慢性支气管炎，支气管哮喘，
肺气肿，尤适于喘息型气管炎。

【规格】每片含盐酸双氯醇胺10 μg

【用法用量】口服，一次2片，一日3次，小儿酌减，饭后服或遵医嘱。

【不良反应】

1. 心血管系统：心悸或者心动过速、心律失常等，有血压升高的个案报告。
2. 精神及神经系统：震颤、头晕、抽搐或者痉挛等，有失眠的个案报告。
3. 消化系统：口干、恶心、胃灼热、呕吐、腹泻、腹痛等。
4. 其他：皮疹、乏力、多汗、胸闷等。

【禁忌】

1. 对本品及所含成份过敏者禁用。
2. 儿童禁用。
3. 下尿路梗阻患者禁用。
4. 肥厚型梗阻性心肌病、快速性心律失常患者禁用。
5. 本品含升华硫（硫磺），阴虚火旺者禁用。

【注意事项】

1. 本品是中西药复方制剂，含化学药组分盐酸克仑特罗（盐酸双氯醇胺、盐酸双氯醇胺），应当尽量避免合并使用与本品相同或者类似组分的其他药品。使用时应当参照盐酸克仑特罗药品说明书的禁忌及注意事项等安全性信息。
2. 高血压、心脏疾病（心功能不全、心律不齐等）患者慎用。
3. 甲状腺功能亢进、糖尿病、肾功能不全患者慎用。
4. 运动员慎用。
5. 本品为处方药，请在医师指导下使用，不建议长期使用，不得超说明书剂量使用。
6. 本品含有化学药组分盐酸克仑特罗，故应当注意：
(1) 用药期间应当注意监测血清钾：曾有服用β₂受体激动剂导致血清钾含

量降低的报道，与黄嘌呤类药物、甾体类药物及利尿剂合并使用时应当注意低钾血症；低氧血症时，血清钾的降低对心脏节律的影响更大，使用时应当特别注意。

(2) 注意药物相互作用：①β受体激动剂、抗胆碱能药、黄嘌呤衍生物（茶碱）和皮质类固醇可能会增强盐酸克仑特罗的作用和不良反应。②β受体阻滞剂对盐酸克仑特罗有拮抗作用。③正接受单胺氧化酶抑制剂或三环类抗抑郁药治疗的患者，应当谨慎使用β₂受体激动剂，因为β₂受体激动剂活性可能被加强。④吸入卤代麻醉药如氟烷、三氯乙烯和安氟醚可增加β₂受体激动剂致心律失常作用。

(3) 避免药物过量：盐酸克仑特罗长期使用或者过量使用时，可致心律不齐或者心力衰竭等严重不良反应，应当特别注意。

(4) 据报道，动物实验（大鼠）中，孕后期使用盐酸克仑特罗后，子宫平滑肌收缩受到抑制，从而引起分娩延迟。盐酸克仑特罗对胎儿的安全性尚不明确，孕妇应当避免使用。盐酸克仑特罗可经乳汁排泄，哺乳期妇女应当停止哺乳或者停药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

本品含盐酸克仑特罗，孕妇应当避免使用本品。哺乳期妇女应当停止哺乳或者停药。

【儿童用药】

儿童禁用。

【老年用药】

老年患者慎用。

【贮藏】

密封。

【包装】铝塑泡罩包装，每板10片，每盒2板。

【有效期】36个月

【执行标准】《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册WS₃-B-0636-91

【批准文号】国药准字Z51022508

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

邮政编码：611731

电话号码：4006607322

传真号码：028-87845888

注册地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

E-mail: dky@dikangyaoye.com

核准日期：2007年08月27日
修改日期：2025年05月20日



喘舒片说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

警示语：本品含升华硫及化学药组分盐酸克仑特罗，
不建议长期使用，不得超说明书剂量使用。
运动员慎用。严禁用于食品和饲料加工。

【药品名称】

通用名称：喘舒片

汉语拼音：Chuanshu Pian

【成份】升华硫、大黄粉、盐酸双氯醇胺、黄芩提取物。

【性状】本品为糖衣片，除去糖衣后显淡黄色。

【功能主治】温肾纳气，化痰定喘。用于慢性支气管炎，支气管哮喘，
肺气肿，尤适于喘息型气管炎。

【规格】每片含盐酸双氯醇胺10 μg

【用法用量】口服，一次2片，一日3次，小儿酌减，饭后服或遵医嘱。

【不良反应】

1. 心血管系统：心悸或者心动过速、心律失常等，有血压升高的个案报告。
2. 精神及神经系统：震颤、头晕、抽搐或者痉挛等，有失眠的个案报告。
3. 消化系统：口干、恶心、胃灼热、呕吐、腹泻、腹痛等。
4. 其他：皮疹、乏力、多汗、胸闷等。

【禁忌】

1. 对本品及所含成份过敏者禁用。
2. 儿童禁用。
3. 下尿路梗阻患者禁用。
4. 肥厚型梗阻性心肌病、快速性心律失常患者禁用。
5. 本品含升华硫（硫磺），阴虚火旺者禁用。

【注意事项】

1. 本品是中西药复方制剂，含化学药组分盐酸克仑特罗（盐酸双氯醇胺、盐酸双氯醇胺），应当尽量避免合并使用与本品相同或者类似组分的其他药品。使用时应当参照盐酸克仑特罗药品说明书的禁忌及注意事项等安全性信息。
2. 高血压、心脏疾病（心功能不全、心律不齐等）患者慎用。
3. 甲状腺功能亢进、糖尿病、肾功能不全患者慎用。
4. 运动员慎用。
5. 本品为处方药，请在医师指导下使用，不建议长期使用，不得超说明书剂量使用。
6. 本品含有化学药组分盐酸克仑特罗，故应当注意：
(1) 用药期间应当注意监测血清钾：曾有服用β₂受体激动剂导致血清钾含

量降低的报道，与黄嘌呤类药物、甾体类药物及利尿剂合并使用时应当注意低钾血症；低氧血症时，血清钾的降低对心脏节律的影响更大，使用时应当特别注意。

(2) 注意药物相互作用：①β受体激动剂、抗胆碱能药、黄嘌呤衍生物（茶碱）和皮质类固醇可能会增强盐酸克仑特罗的作用和不良反应。②β受体阻滞剂对盐酸克仑特罗有拮抗作用。③正接受单胺氧化酶抑制剂或三环类抗抑郁药治疗的患者，应当谨慎使用β₂受体激动剂，因为β₂受体激动剂活性可能被加强。④吸入卤代麻醉药如氟烷、三氯乙烯和安氟醚可增加β₂受体激动剂致心律失常作用。

(3) 避免药物过量：盐酸克仑特罗长期使用或者过量使用时，可致心律不齐或者心力衰竭等严重不良反应，应当特别注意。

(4) 据报道，动物实验（大鼠）中，孕后期使用盐酸克仑特罗后，子宫平滑肌收缩受到抑制，从而引起分娩延迟。盐酸克仑特罗对胎儿的安全性尚不明确，孕妇应当避免使用。盐酸克仑特罗可经乳汁排泄，哺乳期妇女应当停止哺乳或者停药。

【孕妇及哺乳期妇女用药】

本品含盐酸克仑特罗，孕妇应当避免使用本品。哺乳期妇女应当停止哺乳或者停药。

【儿童用药】

儿童禁用。

【老年用药】

老年患者慎用。

【贮藏】

密封。

【包装】铝塑泡罩包装，每板10片，每盒4板。

【有效期】36个月

【执行标准】《卫生部药品标准》中药成方制剂第三册WS₃-B-0636-91

【批准文号】国药准字Z51022508

【上市许可持有人】成都迪康药业股份有限公司

地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

【生产企业】成都迪康药业股份有限公司

生产地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

邮政编码：611731

电话号码：4006607322

销售号码：400-181-8000

传真号码：028-87845888

注册地址：成都高新区（西区）迪康大道一号

E-mail：dkyy@dikangyaoye.com